Технология управления потреблением корма для птицы

ООО «НПФ «ЭЛЕСТ»



Подобед Л.И. Вопросы совершенствования кормления птицы интенсивных кроссов. Птицепром-2017

Суть технологии

- **Введение в рацион птицы регуляторных комплексов Байпас, Хитолоза-л и Фунгистат**

- **Мониторнинг специфических физиологических параметров животного**

- **Оптимизация рациона**

Байпас усиливая гомеостаз питательных веществ в кишечнике, ферментную активность и внутриклеточные энергетические процессы позволяет снижать аминокислотную и протеиновую составляющие корма, выводить из состава корма протеазы и иные ферменты. Хитолоза-л значительно усиливает жировой метаболизм, а также стимулирует микрофлору кишечника птицы и оказывает иммуномодулирующее воздействие. При применении Хитолозы-л становится возможным постепенно снижать содержание жира в корме. Фунгистат решает проблему микотксинов корма и оказывает гепатопротекторный эффект. При применении всех трех продуктов достигается синергидный эффект, наблюдается лучшая конверсия корма, увеличение продуктивности птицы, снижение ветеринарных издержек, становится возможным ремоделирование рациона в сторону снижения его стоимости.

Состав регуляторного комплекса и направленность действия на организм птицы

(Дозировка 4 кг на тонну корма)

Несушка
Фабрика «Русь»

Эффективный метаболизм - Улучшенные производственные показатели





Здоровая птица -
Качественные субпродукты

Контроль

Байпас

Бройлер
ФХ «Русская пулярка»

Байпас усиливая гомеостаз питательных веществ в кишечнике, ферментную активность и внутриклеточные энергетические процессы позволяет снижать аминокислотную и протеиновую составляющие корма, выводить из состава корма протеазы и иные ферменты. При применении Байпаса по сравнению с обычными рационами наблюдается лучшая конверсия корма.

Регуляторный комплекс Хитолоза-л

Инновационный усилитель пищеварения и нейтрализатор токсинов для птицы

(Дозировка 1 л на тонну питьевой воды)

- стимуляторы кишечного пищеварения пре и пробиотики

- усилитель жирового обмена- лизолецитин

- полиненасыщенные жирные кислоты, в том числе Омега-3

- иммуномодулятор

- жидкий сорбент - нейтрализатор токсинов

- витамины

Опубликованные эффекты от применения лизолецитина

Опыт №1 – влияние на конверсию

Европейский исследовательский центр

- 640 голов (кросс: Росс 308)
  8 повторов по 40 голов в каждой группе

Результаты:

Группы	0-10 д	11-23 д	24-35 д	36-42 д	0-42 д
Контрольная группа	1.093	1.473	1.907	2.037	1.747
Опытная группа	1.110	1.446	1.856	1.974	1.708

Опыт №2 университет Данкук 2011г. – снижение протеина в корме (-100 ккал МЕ/кг от сырого протеина)
Цыплята бройлеры Росс 308 – продолжительность опыта 4 недели



Гепатопротекторный нейтрализатор токсинов Фунгистат
Принцип действия

(Дозировка 2 кг на тонну корма)

Композиция из нескольких сорбентов → **Кишечник**
Сорбция токсинов

Гепатопротектор → **Печень**
Защита печени от несорбированных токсинов и от жирового перерождения

Пребиотик → **Кишечник**
деструкция токсинов активированной флорой